

Leki które należy unikać przed i po zabiegach chirurgicznych

Prparaty i leki powodujące przedłużone krwawienie pooperacyjne
Większość z nich wymaga odstawienia na 4-7 dni przed zabiegiem.
Naturalne substancje są wytłuszczone

* Alcohol, especially red wine should be discontinued at least 4 to 5 days before surgery.

Acetylsalicylic

Acid

Advil

Alcoholic

Beverages *

Aleve

Alka-Seltzer

Allicin

Amigesic

Anacin

Anaprox

Anaproxin

Ansaid

APC

Argesic-SA

Arthra-G

Arthrapan

ASA

A.S.A.

Ascodeen

Ascriptin

Aspergum

Aspirin

Baby Aspirin

Bayer

BC Powder

Brufen

Bufferin

Butazolidin

Cephalgesic

Cheracol Caps

Childrens'

Aspirin

Choline

Salicylate

Chrysanthemum -

Pathenium

Clinoril

Congesprin

Cope

Coricidin

Corticosteroids
Coumadin
Cox-1 Inhibitors
Darvon
Depakote
Dexamethasone
Diclofenac
Dipyridamole
Disalcid
Divalproex
Doan's Pills
Dolobid
Dristan
Easprin
Ecotrin
Empirin
Emprazil
Endodan
Excedrin
Feldene
Fenoprofen
Feverfew
4-way cold -
tablets
Froben
**Garlic -
Supplements**
Gelpirin
Genpril
Genprin
Ginko Biloba
Goody's Body -
Pain
Halfprin
Haltran
Ibuprin
Ibuprophen
Idameth
Indocin
Indomethacin
Ketoprofen
Ketorolac
Lortab ASA
Magan
Magnesium
Salicylate
Meclofenamate
Meclofen
Medipren
Mefenamic

Menadol
Midol
Mobidin
Mono-Gesic
Motrin
Nabumetone
Nalfon
Naprosyn
Naproxen
Norgesic
Norwich
N.S.A.I.D.s
Nuprin
Ocufen
Orudis
Oruvail
Oxybutazone
Oxyphenbutazone
Oxaprozin
Pamprin
Peptobismol
Percodan
Persantine
Phenaphen
Phenylbutazone
Piroxicam
Ponstel
Prednisone
Quagesic
- 2 -
Relafen
Rexolate
Robaxisal
Roxiprin
Rufen
Saleto
Salix
Salflex
Salsalate
Salsitab
Sine-Aid
Sine-Off
Sodium
Thiosalicylate
Soma Compound
Sulindac
Synalgos DC
Tanacetum -
Pathenium
Tolectin

Tolmetin
Toradol
Trandate
Trental
Trigesic
Trilisate
Tusal
Vanquish
Vicoprofen
Vitamin E
Voltaren
Warfarin
Willow Bark
Zacrin
Zorprin