

Rektoskopia

Badanie lekarskie mające na celu oglądnięcie kanału odbytu - anoskopia lub całej odbytnicy (ok. 15cm) - rektoskopia, przy pomocy specjalnego sprzętu. Dzięki badaniu można określić struktury anatomiczne odbytu i ocenić patologiczne zmiany w obrębie odbytu, odbytnicy oraz stopień ich zaawansowania.

Badanie wymaga dokładnego przygotowania.

Przygotowanie do badania:

1. Utrzymanie płynnej diety na dwa dni przed badaniem.

W tym czasie nie należy spożywać produktów stałych - chleba, mięsa, ziemniaków. Zalecanie są zupki, papki, przetarte lub zmiksowane posiłki, soki.

W Poradni wykonujemy badanie w czwartki po południu (termin uzgodniony w rejestracji), diety należy utrzymywać od wtorku wieczora do dnia badania.

2. Wykonanie doodbytniczego wlewu oczyszczającego np. Rectanal

(dostępny bez recepty w Aptece) na min 8 godzin przed badaniem, według instrukcji dołączonej do preparatu.

Wlew oczyszczający powoduje nasilone oddawanie 1-3 luźnych stolców.

Badanie przeprowadza się w pozycji kolankowo-łokciowej. Pacjent klęcząc na stole, opiera się o łokcie. Za pomocą podświetlonej rurki ogląda się odbytnicę i kanał odbytu. Podczas badania podaje się do odbytu powietrze, co może wywoływać lekkie uczucie rozpierania.

Badanie jest niebolesne. Podczas badania możliwe jest oprócz oglądnięcia odbytnicy, pobranie wycinków np. przy stwierdzeniu polipów, czy innych zmian organicznych. To również nie wymaga podania leków przeciwbólowych.

Całość badania trwa ok 15 min.